

Bewusteloosheid en reanimatie

Na een ongeval kan het gebeuren dat er een bewusteloosheid optreedt, het kan ook gepaard gaan met hevige bewegingen (krampen), maar hij kan natuurlijk ook muistil liggen. Een oorzaak van bewusteloosheid kan zijn dat de bloedtoevoer naar de hersenen stagneert.

Hoe controleren we of de hond bewusteloos is:

- Hartslag en ademhaling controleren
- Controleren van oogreflex, we raken de oogleden aan, knippen ze dan is de hond niet overleden
- Pupilreflex of voetreflex, als er licht wordt geschoten in het oog zal de pupil vernauwen. Bij de voetreflex moeten we op de tenen drukken en de hond zal zijn poot optillen.
- Anusreflex, als we de huid van de anus aanraken trekt die samen

Na constatering van bewusteloosheid zorgen we dat de tong uit de bek komt, het hoofd in het verlengde van de wervelkolom ligt, zodat de luchtpijp vrijkomt om adem te kunnen halen, contacteer de dierenarts voor verdere behandeling.

Intensiteit van de bewusteloosheid:

- Flauwte : voorbijgaande versuffing, vaak ten gevolge van een harde klap tijdens een ongeval. De reflexen zijn deels verdwenen. De hond is gauw weer bij zijn positieven.
- Coma : Zeer diepe bewusteloosheid. Alle reflexen zijn verdwenen, de ademhaling is traag en oppervlakkig, de pols is nauwelijks te voelen en is onregelmatig. Het dier zal urine en ontlasting laten lopen. Dit is een SPOEDGEVAL.
- Schijn dood : Deze toestand moet onmiddellijk worden herkend, omdat de dood hierop snel volgt. Er zijn geen reflexen meer aanwezig, geen ademhaling meer te ontdekken, de hartslag is traag en onregelmatig, de pols is niet meer te voelen. Er moet direct worden begonnen met kunstmatig ademhaling en eventuele hartmassage, de dierenarts moet onmiddellijk worden ingeschakeld.

REANIMATIE

Indien het dier bewusteloos is en de ademhaling ligt stil moet je onmiddellijk beginnen met kunstmatige ademhaling:

- Het dier op zijn rechterzijde op een harde ondergrond leggen
- De voorpoten naar voren strekken
- Als er een gat is in de borstwand, deze afdekken met plastic (bijkomstig)
- De hals strekken
- De tong zo ver mogelijk naar voren trekken en kijken of er niets in de keel zit
- Al deze handelingen moeten zeer snel gebeuren
- Sluit de muil
- Trek de bovenlip over de onderlip, zodat er geen lucht door de muil heen kan
- De muil met een hand dichthouden
- Plaats de lippen over beide neusgaten
- Blaas lucht in de neus, zodat de borstwand omhoog komt. De kracht waarmee geblazen moet worden is afhankelijk van de grootte van het dier
- De lippen weghalen en de lucht laten uitstromen

Na een ademhalingsstilstand volgt soms ook een hartstilstand, zodat ook hartmassage nodig is:

- Controleer de pols van het dier op de zogenaamde drukpunten, of controleer rechtstreeks de hartslag in de hartstreek
- Bij een hartstilstand moet onmiddellijk hartmassage toegepast worden.
- Leg het dier op zijn rechterzijde op een harde ondergrond
- Streck de voorpoten zo ver mogelijk naar voren
- Plaats de wortel van de hand vlak achter het schouderblad, ongeveer 5 cm boven het borstbeen.
- Druk met krachtige maar vloeiende en gecontroleerde stoten op de borstwand
- De kracht waarmee gedrukt wordt is afhankelijk van de grootte van het dier. Bij kleine dieren kan men ook de borstkas in een hand nemen en hem met de hand samendrukken. Dikwijls is er ook gelijktijdig kunstmatige ademhaling nodig.
- Controleer na enkele cycli of het hart zelfstandig werkt.
- Indien je alleen bent beadem je het dier 2 x en ga je over tot een cyclus van 15 - 25 x hartmassage
- Ben je met z'n tweeën kun je 1 x beademen, waarna je medewerker 5 x hartmassage toedient
- Herhaal die cycli tot de ademhaling herneemt of tot de dierenarts aanwezig is
- Indien het dier moet vervoerd worden, moet de kunstmatige ademhaling voortgezet worden tot bij de dierenarts

Wees kalm!!