

Botbreuken en verstuikingen

1. Botbreuken

Een ongeluk is vlug gebeurt, soms gebeurt het dat jonge honden bij het spelen ongelukkig terechtkomen en een poot breken. Ook bij verkeersongelukken zien we vaak botbreuken optreden. Vaak zien we een breuk van het dijbeen, het scheenbeen in combinatie met het kuitbeen, het opperarmbeen, het spaakbeen in combinatie met de ellepijp. Ook wordt de onderkaak nogal eens bij verkeersongelukken gebroken.

Er bestaan 2 soorten breuken:

- Gesloten breuk: bij een gesloten breuk is de huid niet beschadigt
- Open breuk: bij een open breuk is er een huidwond die de verbinding met de buitenwereld maakt. Deze is gevaarlijk omdat het bot en het beenmerg in direct contact met de omgeving komt en er zo een grote kans ontstaat op infectie, vandaar gelijk de wond afdekken met een steriel gaas.

A. Eerste hulp bij botbreuken:

Waarneming:

- Het bot is op een andere plaats te bewegen dan waar het gewricht zich bevindt
- Er ontstaat op de plaats van de breuk een zwelling
- Door beschadiging van weefsel en bloedvaten ontstaat er een bloeditstorting
- Bij bewegen van de poot voel je de botten langs elkaar krassen, dit moet natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden
- Uw hond kan niet op zijn poot staan

Behandeling:

- Zorgen dat de gebroken poot zo min mogelijk beweegt, om complicaties en pijn te voorkomen
- Eventueel een open wond met steriel gaas afdekken
- Uw gewonde hond naar de dierenarts vervoeren, waarbij hij ligt op een zo vlak mogelijke onderlaag
- Loopt hij of zij zelf op drie poten, laat uw hond dat dan zo rustig mogelijk doen
- Geef geen pijnstillers, want hij mag de poot niet gebruiken

Nabehandeling:

- Zorg dat de hond na het zetten van de breuk een goede doorbloeding heeft om de genezing te bevorderen
- Bouw het lopen op de poot langzaam op, met korte stukjes aan de lijn zodat de bespiering zich weer langzaam kan opbouwen.
- Eventueel kan je kiezen voor enkele behandelingen bij een dieren fysiotherapeut om de genezing te bevorderen

2. Verstuikingen

Ook een verstuiking kan door een foutieve sprong of val plaatsvinden. Dit is een uitrekking of zelfs scheuring van gewrichtskapsel en gewrichtsbanden, vaak doordat de botstukjes die zich in het gewricht bevinden door geweld van buitenaf verschuiven. De botstukken komen daarna wel weer op hun oorspronkelijke plaats terug.

Waarneming:

- Plotselinge pijn
- Niet meer op de poot kunne staan
- Pijn bij bewegen
- Plaatselijke zwelling en warmte

Behandeling:

- Met een stevig, nat en koud verband het gewricht onbeweeglijk maken
- Eerste uren verband nat en koud houden
- Verband tijdig wisselen om verdere zwelling tegen te gaan
- Rust geven
- Als de zwelling niet meer toeneemt, warm houden

Raadpleeg steeds uw dierenarts.